

ИСЛА МИНТ

Пастилки

Листок-вкладыш: информация для пациентов

Внимательно прочитайте этот листок-вкладыш перед тем, как начать принимать данный препарат.

Сохраните листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его снова. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

Что входит в состав Исла Минт?

1 пастилка содержит 80 мг водного экстракта исландского мха (0.4 – 0.8 : 1).

Вспомогательные вещества: акация, сорбитол, парафин жидкий, аспартам, хлорофиллин-медный комплекс (E141), масло мяты перечной, вода очищенная.

1 пастилка содержит 392 мг сорбитола (заменитель сахара) = 0.031 хлебных единиц.

Когда применяют Исла Минт?

Содержащиеся в Исла Минт ингредиенты обволакивают слизистые оболочки глотки и носоглотки и защищают их от воздействия вредных внешних факторов и различного рода

раздражителей, это помогает их быстрому восстановлению.

Показания к применению

- охриплость голоса и першение в горле
- повышенная нагрузка на голосовые связки у певцов, ораторов
- сухой воздух с недостаточным уровнем влажности
- сухость во рту
- затрудненное носовое дыхание

Когда нельзя применять Исла Минт?

Если у Вас повышенная чувствительность к какому-либо ингредиенту препарата.

Что Вы должны знать перед тем, как начнете применять препарат Исла Минт?

Пациентам с фенилкетонурией следует учитывать, что пастилки содержат аспартам, источник фенилаланина.


Одна пастилка содержит 385 мг сорбита. Исла Минт не следует принимать пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы.

Пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что одна пастилка содержит 0,390 г углеводов, что соответствует 0,03 хлебным единицам.

Можно ли применять Исла Минт во время беременности и кормления грудью?

Нет данных, которые говорили бы против применения Исла Минт во время беременности и кормления грудью.





Как следует применять Исла Минт?

Взрослым и детям старше 4 лет принимать по 1-2 пастилки несколько раз в день, давая им медленно раствориться во рту.

Как долго можно применять Исла Минт?

Пастилки можно применять в течение длительного времени. Если через 10 дней применения препарата улучшения состояния не последовало, необходимо проконсультироваться с врачом.

Какие нежелательные побочные эффекты может вызывать Исла Минт?

Очень редко препарат может оказывать слабительное действие из-за содержания в нем

сорбитола. В редких случаях могут возникать реакции гиперчувствительности.

На что Вы еще должны обратить внимание?

Срок годности 4 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от влаги и недоступном для детей месте.

Какие размеры упаковки доступны?

По 10 пастилок помещают в блистеры из алюминиевой фольги и ПВХ-пленки.

3 блистера (30 пастилок) вместе с листком-вкладышем помещают в картонную коробку.

Производитель

Энгельгард Арцнаймиттель ГмбХ
и Ко. КГ

Херцбергштрассе 3, 61138

Нидердорфельден, Германия

Тел.: + 49(0) 6101 / 539 – 300

Факс: + 49(0) 6101 / 539 – 315

Internet: <http://www.engelhard.de>

E-mail: info@engelhard.de

Болдер Арцнаймиттель ГмбХ
и Ко. КГ

Рейнише Аллее 11, 50858 Кельн,
Германия

Представительство

АО «Alpen Pharma AG»

в Республике Беларусь

220053, г. Минск,

ул. Пархоменко дом 3, офис 1Б

Тел.: (+375 17) 348 06 42

info.belarus@alpenpharma.com



ENGELHARD

Stand: 07/21; PB1632000





**Листок-вкладыш:
информация для пациентов**

ИСЛА МООС

Пастилки

Внимательно прочитайте этот листок-вкладыш перед тем, как начать принимать данный препарат.

Сохраните листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его снова. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

Что входит в состав Исла Моос?

1 пастилка содержит 80 мг водного экстракта исландского мха (0.4 – 0.8 : 1).

Вспомогательные вещества: акация, сахароза, парафин жидкий, карамель (E150c), вода очищенная.

1 пастилка содержит 424 мг сахарозы = 0.035 хлебных единиц.

Когда применяют Исла Моос?

Содержащиеся в Исла Моос ингредиенты обволакивают слизистые оболочки глотки и носоглотки и защищают их от действия вредных внешних факторов и различного вида раздражителей, это помогает их бы-

строму восстановлению.

Показания к применению

- охриплость голоса и першение в горле
- повышенная нагрузка на голосовые связки у певцов, ораторов
- сухой воздух с недостаточным уровнем влажности
- сухость во рту
- затрудненное носовое дыхание

Когда нельзя применять Исла Моос?

Если у Вас повышенная чувствительность к какому-либо ингредиенту препарата.

Что Вы должны знать перед тем, как начнете применять препарат Исла Моос?

Препарат Исла Моос необходимо принимать с осторожностью пациентам, страдающим сахарным диабетом. В одной пастилке содержится 424 мг сахарозы, что соответствует 0,035 хлебных единиц. В связи с содержанием сахарозы пастилки не следует принимать пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или сахарозной-изомальтазной недостаточностью.

Можно ли применять Исла Моос во время беременности и кормления грудью?

Нет данных, которые говорили бы против применения Исла Моос во время беременности и кормления грудью.





Как следует применять Исла Моос?

Взрослым и детям старше 4 лет принимать по 1-2 таблетки несколько раз в день, давая им медленно раствориться во рту.

Как долго можно применять Исла Моос?

Таблетки можно применять в течение длительного времени. Если через 10 дней применения препарата улучшения состояния не последовало, необходимо проконсультироваться с врачом.

Какие нежелательные побочные эффекты может вызывать Исла Моос?

В редких случаях могут возникать реакции гиперчувствительности.

На что Вы еще должны обратить внимание?

Срок годности 4 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от влаги и недоступном для детей месте.

Какие размеры упаковки доступны?

По 10 таблеток помещают в блистеры из алюминиевой фольги и ПВХ-пленки.

3 блистера (30 таблеток) вместе с листком-вкладышем помещают в картонную коробку.

Производитель

Энгельгард Арцнаймиттель ГмбХ
и Ко. КГ
Херцбергштрассе 3, 61138
Нидердорфелден, Германия
Тел.: + 49(0) 6101 / 539 – 300
Факс: + 49(0) 6101 / 539 – 315
Internet: <http://www.engelhard.de>
E-mail: info@engelhard.de

Болдер Арцнаймиттель ГмбХ
и Ко. КГ
Рейнише Аллее 11, 50858 Кельн,
Германия

Представительство
АО «Alpen Pharma AG»
в Республике Беларусь
220053, г. Минск,
ул. Пархоменко дом 3, офис 1Б
Тел.: (+375 17) 348 06 42
info.belarus@alpenpharma.com



ENGELHARD

Stand: 07/21; PB1632100

